

VERBENACEAE

(Subdivisión Magnoliophytina, clase Magnoliopsida, subclase Lamiidae)

51. *Verbena officinalis* L.

Cast.: Verbena

Eusk.: Berbena belar



Caracteres diagnósticos:

Hierba perenne de hasta 0,7 m de altura, con tallos de sección cuadrangular de ángulos escábridos (con pelos cortos, rígidos y ásperos). Tallo y hojas con pelos dispersos. Hojas **opuestas**, las inferiores pecioladas, con limbo triangular de hasta 9 cm de longitud, pinnatífido a pinnatipartido, con los lóbulos \pm divididos o dentados; las superiores casi sésiles, menores y de forma más sencilla. Las inflorescencias son laxas espigas multifloras, largas y estrechas, agrupadas en panículas. Flores **pequeñas**, sésiles, con cáliz tetrámero o pentámero, de 2 mm de longitud, y corola pentámera formando un corto tubo (3-5 mm) que se abre en 5 lóbulos, ligeramente bilabiada, de **color lila**. 4 estambres fusionados a la corola e incluidos dentro del tubo corolino. Ovario súpero, bicarpelar, que fructifica en un lomento con clusas pequeñas (1,5-2 mm), longitudinalmente acostilladas, pardo oscuras. Florece durante el verano.

Forma vital: Hemicriptófito.

Ecología y distribución en la Península Ibérica:

Ruderal nitrófila: frecuente en lugares alterados, baldíos, escombreras, praderas \pm pisoteadas, caminos, etc., en toda la Península.

Distribución general:

Holártica, hoy en día subcosmopolita.