

SCROPHULARIACEAE

(Subdivisión Magnoliophytina, clase Magnoliopsida, subclase Lamiidae)

58. *Digitalis purpurea* L.

Cast.: Digital, dedalera

Eusk.: Kukuprakak



Caracteres diagnósticos:

Hierba bianual o perenne, de hasta 1,5 m. Hojas **alternas**, las basales reunidas en una roseta, pecioladas con limbo ovado-lanceolado y margen dentado, densamente pilosas sobre todo por el envés, que tiene una coloración grisácea. Nerviación **reticulada** (reticulódromas) muy saliente por el envés. Inflorescencia en un largo **racimo** terminal. Flores pedunculadas y algo péndulas, muy vistosas. Cáliz pentámero, verde. Corola de 40-55 mm de longitud, en forma de tubo ancho apenas lobulado en la porción distal, de color **púrpura** con manchas oscuras en su interior. Androceo formado por 4 estambres didínamos (= de longitud desigual, dos más largos que los otros dos), fusionados a la corola y cuyas anteras se disponen en la parte superior del tubo de la corola. Gineceo bicarpelar, con ovario súpero que fructifica en una cápsula de dehiscencia valvar.

Florece entre la primavera y el verano.

Forma vital: Hemicriptófito.

Ecología y distribución en la Península Ibérica:

Claros forestales, con suelos removidos (taludes, pistas, repoblaciones), en enclaves frescos y algo húmedos. Frecuente sobre todo a partir de una cierta altitud (500-1700 m). Norte y Occidente de la Península, y sistemas montañosos del Centro y Sur.

Distribución general:

Europa atlántica, penetrando hacia el parte central.